



Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1^ο

- A. Θεωρία από σχολικό βιβλίο στη σελίδα 83
- B. Θεωρία από σχολικό βιβλίο στη σελίδα 41
- C. $1 \rightarrow \Sigma\omegaστό 2 \rightarrow \Sigma\omegaστό 3 \rightarrow \Delta\alphaθος$
 $4 \rightarrow \Delta\alphaθος 5 \rightarrow \Delta\alphaθος$.

ΘΕΜΑ 2^ο

- i) Έστω ότι η (1) δεν παριστάνει ευθεία, τότε θα υπάρχει $\alpha \in \mathbb{R}$, τέτοιο ώστε:

$$\begin{cases} 2\alpha + 1 = 0 \\ \alpha - 1 = 0 \end{cases}$$
 Άποφοι, διότι το σύστημα είναι αδύνατο.
 Άρα η (1) παριστάνει ευθεία για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$.
- ii) Παρατηρούμε ότι οι συντεταγμένες του σημείου M, επαληθεύουν την (1).
 Πράγματι $(2\alpha+1)(-1)+(α-1)2+3=-2\alpha-1+2\alpha-2+3=0$,
 άρα οι ευθείες της μορφής (1), διέρχονται από το M(-1,2).
- iii) Για $\alpha = 0$, προκύπτει η ευθεία με εξίσωση $x-y+3=0$.
 Το σύστημα $\begin{cases} x+5y-3=0 \\ x-y+3=0 \end{cases}$ έχει λύση $\begin{cases} x=-2 \\ y=1 \end{cases}$, άρα A(-2,1).
 Για $\alpha = -1$, προκύπτει η ευθεία με εξίσωση $-x-2y+3=0$.
 Το σύστημα $\begin{cases} x+5y-3=0 \\ -x-2y+3=0 \end{cases}$ έχει λύση $\begin{cases} x=3 \\ y=0 \end{cases}$, άρα B(3,0).
 $\overrightarrow{AB} = (5, -1)$ και $\overrightarrow{AM} = (1, 1)$, άρα

$$(AMB) = \frac{1}{2} \left| \det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}) \right| = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = 3 \text{ τ.μ.}$$

ΘΕΜΑ 3^ο

i) Για $\lambda=1$ η (1) γίνεται: $C_1: y^2 = 6x$, εξίσωση παραβολής με $p=3$,

$$\text{διευθετούσα } \delta: x = -\frac{3}{2} \text{ και εστία } E\left(\frac{3}{2}, 0\right)$$

ii) Για $\lambda=2$ η (1) γίνεται: $C_2: x^2 + y^2 = 16$, εξίσωση κύκλου με κέντρο $O(0,0)$ και ακτίνα $R=4$.

iii) Η έλλειψη έχει τις εστίες της στον άξονα των x , και αφού η μία είναι $E(3/2, 0)$ είναι $\gamma=3/2$. Ακόμη $2\alpha=4$ άρα $\alpha=2$. Επομένως: $\beta^2=\alpha^2-\gamma^2=7/4$. Άρα η ζητούμενη έλλειψη έχει εξίσωση:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{\frac{7}{4}} = 1$$

Η εκκεντρότητα είναι: $\varepsilon=\gamma/\alpha=3/4$.

iv) Λύνουμε το σύστημα των C_1, C_2 . Με απαλοιφή των y προκύπτει η εξίσωση: $x^2+6x-16=0$ η οποία έχει λύσεις $x=2$ & $x=-8$ που απορρίπτεται γιατί η παραβολή έχει $\rho=3>0$. Επομένως: $y^2=12 \Leftrightarrow y=\pm 2\sqrt{3}$. Άρα τα σημεία τομής είναι: $P_1(2, 2\sqrt{3})$ και $P_2(2, -2\sqrt{3})$.

Από τον ορισμό της παραβολής $d(P_1, \delta) = (P_1, E)$ και $d(P_2, \delta) = (P_2, E)$ αφού P_1, P_2 είναι σημεία της παραβολής. Επομένως ισχύει ότι: $d(P_1, \delta) - (P_1, E) = d(P_2, \delta) - (P_2, E)$.

ΘΕΜΑ 4^ο

A. α. Av 2 $\alpha \neq \beta$ τότε $\varphi=0$, άτοπο αφού $\varphi=\pi/3$.

β. $A = 2|\vec{\alpha}|, B = -|\vec{\beta}|, \Gamma = \vec{\alpha}\vec{\beta}$.

Η (1) παριστάνει κύκλο αν και μόνο αν $A^2+B^2-4\Gamma>0$.

Πράγματι: $A^2+B^2-4\Gamma=4\vec{\alpha}^2 + \vec{\beta}^2 - 4\vec{\alpha}\vec{\beta} = |2\vec{\alpha} - \vec{\beta}|^2 > 0$

αφού το $|2\vec{\alpha} - \vec{\beta}| = 0$ δίνει $2\vec{\alpha} = \vec{\beta}$ και απορρίπτεται.

$$\text{Άρα } \rho = \frac{\sqrt{|2\vec{\alpha} - \vec{\beta}|^2}}{2} = \frac{1}{2} |2\vec{\alpha} - \vec{\beta}|.$$

B. α. Είναι $K\left(\left| \vec{\alpha} \right|, \frac{\left| \vec{\beta} \right|}{2} \right) = (1, 1)$, άρα $\left| \vec{\alpha} \right|=1$, $\left| \vec{\beta} \right|=2$

$$\text{Επομένως } \rho^2 = \frac{\vec{\alpha}^2 + \vec{\beta}^2 - 4 \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} \cdot \cos \phi}{4} = 1 \Leftrightarrow \rho = 1$$

$$\beta. d(K, \varepsilon) = \frac{|3+4-12|}{\sqrt{3^2+4^2}} = 1 = \rho. \text{ Άρα ο κύκλος με εξίσωση την (1)}$$

εφάπτεται στην ευθεία: $3x+4y-12=0$.

γ.

Αν $\vec{V} = \pi \rho \circ \beta_{\vec{\alpha}} \vec{\beta}$, τότε υπάρχει λ , ώστε $\vec{V} = \lambda \vec{\alpha}$, αφού $\vec{V} \perp \vec{\alpha}$.

Ακόμα:

$$\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = \vec{\alpha} \cdot \vec{V} \Leftrightarrow \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = \lambda (\vec{\alpha})^2 \Leftrightarrow \lambda = 1.$$

Άρα $\vec{V} = \pi \rho \circ \beta_{\vec{\alpha}} \vec{\beta} = \vec{\alpha}$.