

**ΤΑΞΗ:**

Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

**ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:**

ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

**ΜΑΘΗΜΑ:**

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

**Ημερομηνία: Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012**

### ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

#### ΘΕΜΑ Α

- A1. Βλέπε Σχολικό Βιβλίο, σελίδα 217 την απόδειξη του Θεωρήματος.
- A2. Βλέπε Σχολικό Βιβλίο, σελίδα 150 τον ορισμό του μεγίστου.
- A3. Βλέπε Σχολικό Βιβλίο, σελίδα 234 την απόδειξη του τύπου  $(\alpha^x)' = \alpha^x \ln a$ .
- A4. i. Αληθής. Βλέπε Σχολικό Βιβλίο, σελίδα 132 τα σχόλια.  
 ii. Ψευδής. Βλέπε Σχολικό Βιβλίο, σελίδα 90 τις δυνάμεις του  $i$  με  $v = 3$ .  
 iii. Αληθής. Βλέπε Σχολικό Βιβλίο, σελίδα 165 το Θεώρημα  $1^\circ$ .  
 iv. Αληθής. Βλέπε Σχολικό Βιβλίο, σελίδα 241 τον ορισμό του ρυθμού μεταβολής.  
 v. Αληθής. Βλέπε Σχολικό Βιβλίο, σελίδα 261 το σχόλιο του Θεωρήματος του Fermat.

#### ΘΕΜΑ Β

- B1. Τα πεδία ορισμού των  $f$ ,  $g$  είναι αντίστοιχα τα  $A_f = \mathbb{R}$  και  $A_g = (0, +\infty)$

- Η  $f \circ g$  έχει πεδίο ορισμού το σύνολο

$$\{x \in A_g \text{ και } g(x) \in A_f\} = \{x > 0 \text{ και } g(x) \in \mathbb{R}\} = (0, +\infty)$$

Για τέτοιες τιμές του  $x$ , έχουμε:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = e^{g(x)-2} = e^{\ln x} = x$$

Ωστε  $(f \circ g)(x) = x$  με  $x \in (0, +\infty)$

- Η  $g \circ f$  ορίζεται στο σύνολο

$$\{x \in A_f \text{ και } f(x) \in A_g\} = \{x \in \mathbb{R} \text{ και } e^{x-2} > 0\} = \mathbb{R}$$

Για τέτοιες τιμές του  $x$ , έχουμε:

$$(g \circ f)(x) = \ln f(x) + 2 = \ln e^{x-2} + 2 = (x-2) + 2 = x$$

Ωστε  $(g \circ f)(x) = x$  με  $x \in \mathbb{R}$

Παρατηρούμε ότι οι συναρτήσεις  $fog$  και  $gof$  δεν έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού, επομένως δεν είναι ίσες.

**B2.** Για κάθε  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  έχουμε

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow x_1 - 2 \neq x_2 - 2 \Rightarrow e^{x_1-2} \neq e^{x_2-2} \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

Επομένως η  $f$  είναι 1-1 και έχει αντίστροφη. Έχουμε

$$\begin{aligned} y = f(x) &\Leftrightarrow y = e^{x-2} \\ &\Leftrightarrow x - 2 = \ln y, \quad y > 0 \\ &\Leftrightarrow x = \ln y + 2, \quad y > 0 \end{aligned}$$

Άρα  $f^{-1}(x) = \ln x + 2, \quad x > 0$

**B3** Θεωρούμε την συνάρτηση  $h(x) = e^{x-2} - \ln x - 2, \quad x \in [e^{-2}, 2]$ .

- Η  $h$  είναι συνεχής. Πράγματι η συνάρτηση  $e^{x-2}$  είναι συνεχής, ως σύνθεση της πολυωνυμικής  $x - 2$  με την εκθετική  $e^x$ , οι οποίες είναι συνεχείς. Επομένως η  $h$  είναι συνεχής, γιατί προκύπτει από πράξεις των συνεχών συναρτήσεων  $e^{x-2}$ ,  $\ln x$  (λογαριθμική) και 2 (σταθερή).
- Είναι

$$h(e^{-2}) = e^{e^{-2}-2} - \ln e^{-2} - 2 = e^{e^{-2}-2} + 2 - 2 = e^{e^{-2}-2} > 0$$

και

$$h(2) = e^{2-2} - \ln 2 - 2 = -1 - \ln 2 < 0$$

Οπότε:

$$h(e^{-2}) \cdot h(2) = e^{e^{-2}-2} (-1 - \ln 2) < 0$$

Εφαρμόζεται, επομένως το Θεώρημα του Bolzano για την  $h$  στο διάστημα  $[e^{-2}, 2]$ , οπότε υπάρχει  $x_0 \in (e^{-2}, 2)$  με  $h(x_0) = 0$ . Τότε

$$h(x_0) = 0 \Leftrightarrow e^{x_0-2} - \ln x_0 - 2 = 0 \Leftrightarrow e^{x_0-2} = \ln x_0 + 2$$

Αντό σημαίνει, ότι η εξίσωση  $e^{x-2} = \ln x + 2$  έχει ως ρίζα τον αριθμό  $x_0 \in (e^{-2}, 2)$  και αποδεικνύει το ζητούμενο.

**B4.** Είναι  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{(gof)(x)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{x-2}}{x} = 0$ , γιατί

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x-2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^2} = \frac{1}{e^2} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \frac{1}{e^2} \cdot 0 = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$

Ακόμα,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{(fog)(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x + 2}{x}$ . Επειδή  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x + 2) = +\infty$  και  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$

έχουμε απροσδιόριστη μορφή  $\frac{\infty}{\infty}$ . Είναι  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x + 2)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ , οπότε από

το αντίστοιχο θεώρημα του De L' Hospital έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{(f \circ g)(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x + 2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x + 2)'}{(x)'} = 0$$

$$\text{Ωστε } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{(g \circ f)(x)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g(x)}{(f \circ g)(x)} = 0$$

### ΘΕΜΑ Γ

**Γ1.** i Είναι  $1+3\alpha^2 \neq 0$ , οπότε:

Η συνάρτηση  $2tf(t)$  είναι συνεχής, ως γινόμενο των συνεχών συναρτήσεων  $2t$  και  $f(t)$ , οπότε η συνάρτηση που ορίζεται από το ολοκλήρωμα  $\int_1^x 2tf(t)dt$  είναι παραγωγίσιμη, άρα και  $-\int_1^x 2tf(t)dt$

είναι παραγωγίσιμη ως σύνθεση παραγωγίσιμων συναρτήσεων, της  $-\int_1^x 2f(t)dt$  με την εκθετική  $e^x$ . Το γινόμενό της επί τον αριθμό  $\frac{1}{1+3\alpha^2}$ ,

δηλαδή η  $f(x) = \frac{1}{1+3\alpha^2} e^{-\int_1^x 2tf(t)dt}$  είναι παραγωγίσιμη. Έχουμε

$$f'(x) = \frac{1}{1+3\alpha^2} \left( e^{-\int_1^x 2tf(t)dt} \right)' = \frac{1}{1+3\alpha^2} e^{-\int_1^x 2tf(t)dt} \left( -\int_1^x 2tf(t)dt \right)'$$

$$= f(x)(-2xf(x)) = -2xf^2(x)$$

Για κάθε  $x \in \mathbb{R}$  είναι  $f(x) > 0$ , αφού  $1+3\alpha^2 > 0$  και  $e^{-\int_1^x 2tf(t)dt} > 0$ . Έτσι

$$f'(x) = -2xf^2(x) \Leftrightarrow \frac{f'(x)}{f^2(x)} = -2x \Leftrightarrow \left[ \frac{1}{f(x)} \right]' = (x^2)$$

Επομένως υπάρχει  $c \in \mathbb{R}$  ώστε

$$\frac{1}{f(x)} = x^2 + c \quad (2)$$

$$\text{Η (1) για } x = 1 \text{ δίνει } f(1) = \frac{1}{1+3\alpha^2}.$$

$$\text{Η (2) δίνει } \frac{1}{f(1)} = 1+c \Leftrightarrow 1+3\alpha^2 = 1+c \Leftrightarrow c = 3\alpha^2$$

$$\text{Άρα η (2) δίνει } f(x) = \frac{1}{x^2 + 3\alpha^2}, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

**Γ2.** Έχουμε

## ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

E\_3.Μλ3ΘT(a)

$$\int_0^\alpha t f(t) dt = \int_0^\alpha \frac{t}{t^2 + 3\alpha^2} dt = \frac{1}{2} \int_0^\alpha \frac{(t^2 + 3\alpha^2)'}{t^2 + 3\alpha^2} dt = \left[ \frac{1}{2} \ln |t^2 + 3\alpha^2| \right]_0^\alpha$$

$$= \frac{1}{2} \ln 4\alpha^2 - \frac{1}{2} \ln 3\alpha^2 = \frac{1}{2} \ln \frac{4}{3}$$

Η τιμή αυτή είναι ανεξάρτητη του  $\alpha$ .

- Γ3.** Η  $f$ , ως ρητή, είναι συνεχής και δύο φορές παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$  με

$$f'(x) = \left( \frac{1}{x^2 + 3\alpha^2} \right)' = \frac{(x^2 + 3\alpha^2)'}{(x^2 + 3\alpha^2)^2} = -\frac{2x}{(x^2 + 3\alpha^2)^2}$$

Το πρόσημο της  $f'$  με την μονοτονία και το ακρότατο της  $f$  φαίνονται στον επόμενο πίνακα:

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$f'$	$+$	$0$	$-$
$f$		$\frac{1}{3\alpha^2}$	

Η  $f$  είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα  $(-\infty, 0]$ , γνησίως φθίνουσα στο  $[0, +\infty)$  και έχει ολικό μέγιστο το  $f(0) = \frac{1}{3\alpha^2}$ .

Για την  $f''$  έχουμε:

$$f''(x) = -2 \left[ \frac{x}{(x^2 + 3\alpha^2)^2} \right]' = -2 \frac{(x^2 + 3\alpha^2)^2 - x[(x^2 + 3\alpha^2)^2]'}{(x^2 + 3\alpha^2)^4} = \\ = -2 \frac{(x^2 + 3\alpha^2)^2 - 4x^2(x^2 + 3\alpha^2)}{(x^2 + 3\alpha^2)^4} = -2 \frac{x^2 + 3\alpha^2 - 4x^2}{(x^2 + 3\alpha^2)^3} = 6 \frac{x^2 - \alpha^2}{(x^2 + 3\alpha^2)^3}$$

Το πρόσημο της  $f''$  με την κυρτότητα της  $f$  και τα σημεία καμπής της φαίνονται στον επόμενο πίνακα:

$x$	$-\infty$	$- \alpha $	$ \alpha $	$+\infty$
$f''$	$+$	$0$	$-$	$0$
$f$		$\frac{1}{4\alpha^2}$ σ.κ		$\frac{1}{4\alpha^2}$ σ.κ

Η  $f$  είναι κυρτή σε καθένα από τα διαστήματα  $(-\infty, -|\alpha|]$ ,  $[|\alpha|, +\infty)$  και κοίλη στο διάστημα  $[-|\alpha|, |\alpha|]$ . Έχει σημεία καμπής τα  $(-|\alpha|, 1/4\alpha^2)$  και  $(|\alpha|, 1/4\alpha^2)$

## ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

E\_3.Μλ3ΘT(a)

Η  $f$ , ως συνεχής στο  $\mathbb{R}$ , δεν έχει κατακόρυφες ασύμπτωτες. Στα  $+\infty$  και  $-\infty$  έχουμε:


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2 + 3\alpha^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2 + 3\alpha^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

Άρα έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο  $+\infty$  και στο  $-\infty$  τον άξονα των  $x$ . Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπληρώνουμε τον επόμενο πίνακα μεταβολών:

$x$	$-\infty$	$- \alpha $	$0$	$ \alpha $	$+\infty$
$f'$	+		0	-	
$f''$	+	0	-	0	+
$f$	0	$\frac{1}{4\alpha^2}$ σ.κ.	$\frac{1}{3\alpha^2}$ max	$\frac{1}{4\alpha^2}$ σ.κ.	0

Η γραφική παράσταση της  $f$  δίνεται στο επόμενο σχήμα:



**Παρατήρηση.** Η  $f$  είναι άρτια αφού για κάθε  $x \in \mathbb{R}$  το  $-x \in \mathbb{R}$  και

$$f(-x) = \frac{1}{(-x)^2 + 3\alpha^2} = \frac{1}{x^2 + 3\alpha^2} = f(x)$$

Επομένως μπορούμε να την μελετήσουμε στο διάστημα  $[0, +\infty)$  και να επεκτείνουμε τα συμπεράσματα στο  $\mathbb{R}$ .

- Γ4.** Το ζητούμενο εμβαδό (βλέπε τη γραφική παράσταση της  $f$ ) είναι μεγαλύτερο από το εμβαδό  $E_1 = |\alpha| \cdot \frac{1}{4\alpha^2} = \frac{1}{4|\alpha|}$  του ορθογωνίου που ορίζεται από τους

## ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

E\_3.Μλ3ΘT(a)

άξονες και τις ευθείες  $x = \alpha$ ,  $y = \frac{1}{4\alpha^2}$ , και μικρότερο από το εμβαδό

$E_2 = |\alpha| \frac{1}{3\alpha^2} = \frac{1}{3|\alpha|}$  του ορθογωνίου που ορίζεται από τους άξονες και τις

ευθείες  $x = \alpha$ ,  $y = \frac{1}{3\alpha^2}$ . Επομένως  $\frac{1}{4|\alpha|} < E < \frac{1}{3|\alpha|}$

**Άλλιώς:** Με  $\alpha > 0$ , επειδή  $f(x) > 0$  είναι  $E = \int_0^\alpha |f(x)| dx = \int_0^\alpha f(x) dx$ . Η  $f$  είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα  $[0, \alpha]$ , οπότε για  $x \in [0, \alpha]$  είναι

$$f(\alpha) \leq f(x) \leq f(0) \Leftrightarrow \frac{1}{4\alpha^2} \leq f(x) \leq \frac{1}{3\alpha^2} \Leftrightarrow f(x) - \frac{1}{4\alpha^2} \geq 0 \text{ και } \frac{1}{3\alpha^2} - f(x) \geq 0$$

Επειδή οι αντίστοιχες ισότητες δεν ισχύουν σε όλο το  $[0, \alpha]$ , έχουμε

$$\begin{aligned} \int_0^\alpha \left[ f(x) - \frac{1}{4\alpha^2} \right] dx &> 0 \quad \text{και} \quad \int_0^\alpha \left[ \frac{1}{3\alpha^2} - f(x) \right] dx > 0 \\ \Leftrightarrow \int_0^\alpha f(x) dx - \frac{x}{4\alpha^2} &> 0 \quad \text{και} \quad \left[ \frac{x}{3\alpha^2} - \int_0^\alpha f(x) dx \right] > 0 \\ \Leftrightarrow E - \frac{1}{4\alpha} &> 0 \quad \text{και} \quad \frac{1}{3\alpha} - E > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{4\alpha} < E < \frac{1}{3\alpha} \end{aligned}$$

Με  $\alpha < 0$  θα εργαστούμε ομοίως.

### ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Θέτουμε

Τότε

και

$$g(x) = \frac{f(x) - 2e^{x+2}}{x+2}, x \neq -2$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} g(x) \neq -1$$

(1)

$$f(x) = (x+2)g(x) + 2e^{x+2}, x \neq -2$$

(2)

Είναι

$$\lim_{x \rightarrow -2} [g(x)(x+2) + 2e^{x+2}] = \lim_{x \rightarrow -2} [g(x)(x+2)] + \lim_{x \rightarrow -2} 2e^{x+2} = 0 + 2 = 2$$

οπότε

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 2$$

Η  $f$ , ως παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$ , είναι συνεχής στο  $\mathbb{R}$ , άρα και στο  $x_0 = -2$ , έτσι

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = f(-2) \Rightarrow f(-2) = 2 \quad (3)$$

Έχουμε, με  $x \neq -2$

$$\frac{f(x) - f(-2)}{x + 2} \stackrel{(1),(3)}{=} \frac{(x+2)g(x) + 2e^{x+2} - 2}{x + 2} = \frac{(x+2)g(x)}{x+2} + 2 \frac{e^{x+2} - 1}{x+2} = g(x) + 2 \frac{e^{x+2} - 1}{x+2}$$

Το όριο  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{e^{x+2} - 1}{x + 2}$  είναι απροσδιόριστη μορφή τύπου  $\frac{0}{0}$ . Παρατηρούμε ότι

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{(e^{x+2} - 1)'}{(x + 2)'} = \lim_{x \rightarrow -2} (e^{x+2})' = e^0 = 1$$

Επομένως, εφαρμόζεται ο αντίστοιχος κανόνας του De L'Hospital σύμφωνα με το οποίο βρίσκουμε

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{e^{x+2} - 1}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(e^{x+2} - 1)'}{(x + 2)'} = 1$$

Τότε

$$f'(-2) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - f(-2)}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2} \left[ g(x) + 2 \frac{e^{x+2} - 1}{x + 2} \right] = \lim_{x \rightarrow -2} g(x) + 2 \lim_{x \rightarrow -2} \frac{e^{x+2} - 1}{x + 2} = 1$$

Στη συνέχεια παρατηρούμε ότι η  $C_f$  είναι κοίλη, γιατί  $f''(x) < 0$  στο  $\mathbb{R}$ . Επομένως τα σημεία της  $C_f$  είναι κάτω από τα αντίστοιχα σημεία της εφαπτομένης της στο σημείο της  $A(-2, f(-2))$ , εκτός του σημείου επαφής που είναι κοινό σημείο. Η εξίσωση της εφαπτομένης είναι:

$$y - f(-2) = f'(-2)(x + 2) \Leftrightarrow y - 2 = x + 2 \Leftrightarrow y = x + 4$$

Άρα  $f(x) \leq x + 4$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$

**Παρατήρηση.** Η σχέση αυτή αποδεικνύεται και με τη βοήθεια της συνάρτησης  $T(x) = f(x) - x - 4$ , η οποία έχει μέγιστο το  $T(-2) = 0$ .

**Δ2.** Είναι  $f(-2) = f(0) = 2$ . Ακόμα η  $f$  είναι συνεχής στο  $[-2, 0]$  και παραγωγίσιμη στο  $(-2, 0)$ , ως παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$ . Εφαρμόζεται, επομένως, το θεώρημα του Rolle για την  $f$  στο διάστημα  $[-2, 0]$ , οπότε υπάρχει  $x_0 \in (-2, 0)$  τέτοιο, ώστε  $f'(x_0) = 0$ . Επειδή  $f''(x) < 0$  η  $f'$  είναι γνησίως φθίνουσα στο  $\mathbb{R}$ , οπότε το  $x_0$  είναι μοναδική της ρίζα και

- για κάθε  $x \in (-\infty, x_0)$  είναι  $x < x_0 \Rightarrow f'(x) > f'(x_0) \Rightarrow f'(x) > 0$
- για κάθε  $x \in (x_0, +\infty)$  είναι  $x > x_0 \Rightarrow f'(x) < f'(x_0) \Rightarrow f'(x) < 0$

Άρα η  $f$  ως συνεχής έχει μέγιστο (ολικό) το  $f(x_0)$  με  $x_0 \in (-2, 0)$ .

**Δ3.** Η  $f'$  είναι γνησίως φθίνουσα στο  $\mathbb{R}$ , επομένως είναι 1-1, οπότε

$$f' \left( \int_0^{2(x-5)} f(t-x) dt \right) = f'(0) \Leftrightarrow \int_0^{2(x-5)} f(t-x) dt = 0 \quad (4)$$

Αρκεί να δείξουμε, ότι η (4) έχει μοναδική ρίζα στο  $\mathbb{R}$  την  $x = 5$ .

## ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

E\_3.ΜΛ3ΘΤ(α)

Πράγματι, για  $x = 5$  η (4) επαληθεύεται, γιατί γίνεται  $\int_0^0 f(t-x)dt = 0$ .

Για να δείξουμε την μοναδικότητα της ρίζας θεωρούμε την συνάρτηση

$$h(x) = \int_0^{2(x-5)} f(t-x)dt, \quad x \in \mathbb{R}$$

Θέτουμε  $t-x = u$ , οπότε  $dt = du$ . Για  $t=0$  το  $u=-x$  και για  $t=2(x-5)$  το  $u=x-10$ , επομένως

$$h(x) = \int_{-x}^{x-10} f(u)du = \int_0^{x-10} f(u)du - \int_0^{-x} f(u)du$$

Επειδή η  $f$  είναι συνεχής, η συνάρτηση  $\phi(x) = \int_0^x f(u)du$  είναι παραγωγίσιμη, επομένως και οι συνθέσεις των  $x-10$  και  $-x$  με την  $\phi$  είναι παραγωγίσιμες με

$$\left( \int_0^{x-10} f(u)du \right)' = (x-10)f(x-10) = f(x-10),$$

$$\left( \int_0^{-x} f(u)du \right)' = (-x)f(-x) = -f(-x)$$

Επομένως η  $h$  είναι παραγωγίσιμη, ως άθροισμα παραγωγίσιμων συναρτήσεων, με

$$h'(x) = f(x-10) + f(-x)$$

Επειδή, από το ερώτημα Δ1  $f(x) \leq x+4$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ , είναι

$$h'(x) = f(x-10) + f(-x) \leq (x-10) + 4 + (-x) + 4 = -2 < 0$$

Άρα η  $h$  είναι γνησίως φθίνουσα, επομένως και 1-1, που σημαίνει ότι η ρίζα της είναι μοναδική. Αυτό αποδεικνύει το ζητούμενο.

- Δ4.** Στο ερώτημα Δ1 δείξαμε ότι  $f'(x) < 0$  στο  $(x_0, +\infty)$  με  $x_0 \in (-2, 0)$ . Επομένως η  $f$  είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα  $[0, +\infty)$ . Είναι  $|z+i| \geq 0$  και  $|z|+1 \geq 1 > 0$ , αφού το μέτρο κάθε μιγαδικού είναι μη αρνητικός αριθμός. Τότε, με  $z = x+iy$ ,  $x, y \in \mathbb{R}$  παίρνουμε:

$$\begin{aligned} f(|z+i|) \leq f(|z|+1) &\Leftrightarrow |z+i| \geq |z|+1 \\ &\Leftrightarrow |x+(y+1)i| \geq |x+iy|+1 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{x^2 + (y+1)^2} \geq \sqrt{x^2 + y^2} + 1 \\ &\Leftrightarrow (\sqrt{x^2 + (y+1)^2})^2 \geq (\sqrt{x^2 + y^2} + 1)^2 \\ &\Leftrightarrow x^2 + y^2 + 2y + 1 \geq x^2 + y^2 + 2\sqrt{x^2 + y^2} + 1 \\ &\Leftrightarrow y \geq \sqrt{x^2 + y^2} \\ &\Leftrightarrow y \geq 0 \text{ και } y^2 \geq (\sqrt{x^2 + y^2})^2 \\ &\Leftrightarrow y \geq 0 \text{ και } x^2 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow y \geq 0 \text{ και } x = 0, \text{ áρα } z = iy, y \in \mathbb{R}^+, \text{ φανταστικός.} \end{aligned}$$